

## Algemeen beeld gezondheid

Net zoals bij andere rassen komen er bij de Stabyhoun ook gezondheidsaandoeningen voor. Gelukkig is dit relatief weinig en zijn er geen echte grote gezondheidsproblemen in het ras. Het is heel belangrijk dat als er een probleem is dit te melden bij de vereniging, met deze gegevens kunnen wij een goed beeld krijgen en fokkers begeiden in het maken van hun keuzes met betrekking tot de fokkerij. Hieronder staan de aandoeningen die een enkele keer per jaar voorkomen bij uitzondering Heupysplasia en Neurologische afwijking is het veel lager.

### Heupdysplasie

Heupdysplasie is een afwijking aan het heupgewricht bij honden waarbij een afwijkende vorm van het gewricht ontstaan. De aandoening is deels erfelijk maar ook kan het milieu waar de hond is opgegroeid een rol spelen. De gewrichtsdelen passen niet goed in elkaar, waardoor er instabiliteit in het gestel en slijtage van het kraakbeen ontstaat. Omdat de Stabyhoun geen zwaar ras is komt het zelden voor dat de Stabyhoun problemen heeft met de heupen. Meestal komt heupdysplasie pas aan het licht bij het maken van röntgenfoto's voor de fokkerij. Wel kan een Stabyhoun met slechtere heupen op latere leeftijd artrose ontwikkelen waardoor deze soms wel last kan hebben.

### Elleboogdysplasie

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor verschillende gewrichtsstoornissen aan de elleboog als gevolg van drukverschillen in de elleboog. Een gevolg kan zijn beschadiging of het afbreken van de ellepijp of kraakbeenletsels van de bovenarm. De vier verschillende vormen zijn: Losse Processus Coronoides, Osteochondritis dissecans, Losse Processus Anconalis en incongruentie. is een verzamelnaam voor 3 soorten ontwikkelingsstoornissen aan de ellebooggewrichten, veroorzaakt door zowel erfelijke als milieufactoren. Lijders vertonen kreupelheid aan de voorbenen. ED kan worden vastgesteld door het maken van röntgenfoto's, dragers kunnen er niet mee herkend worden.

### Epilepsie

Epilepsie vindt plaats als gevolg van abrupte, tijdelijke verstoringen van de elektrische activiteit van de hersencellen. Epilepsie wordt onderverdeeld in een primaire en een secundaire vorm. De primaire vorm kan erfelijk zijn en de secundaire vorm kan diverse oorzaken hebben. Epilepsie komt voor in alle hondenrassen en bij enkele gevallen van epilepsie kan euthanasie noodzakelijk worden geacht.

### Persisterende Ductus Arteriosus

Persisterende ductus arteriosus botalli (PDA) is een hartaandoening. De Ductus Arteriosus (DA) is een bloedkanaal dat tijdens de dracht functioneel is, echter na de geboorte hoort deze te sluiten. Indien het kanaal open blijft, is er sprake van PDA. Een gevolg is dat er bloed stroomt van de aorta (lichaamslagader) naar de arteria pulmonalis (longslagader). PDA wordt bijna in alle gevallen ontdekt bij de eerste dierenartscontrole met 6 weken. Door een operatie kan het kanaal dicht gemaakt

worden, als dit op jonge leeftijd gebeurd heeft de stabyhoun na een geslaagde operatie dezelfde levensverwachting als een andere stabyhoun.

#### **Neurologische afwijking**

De neurologische afwijking kenmerkt zich door pups die dwangmatig gedrag vertonen zoals rondjes lopen en of achteruit lopen. De problemen ontstaat rond de 6 weken. De pups die tot nu toe geboren zijn met dit probleem zijn allen ingeslapen.

#### **Von Willebrands Disease**

Von Willebrands Disease is een bloedstollingsafwijking die in 3 types voorkomt. Bij de Stabyhoun is type I geconstateerd, de meest milde vorm. Von Willebrands Disease is een stollingsziekte maar bij type 1 merkt u in de meeste gevallen niks aan uw stabyhoun. In sommige gevallen blijft uw hond iets langer bloeden bij een verwonding maar in de meeste gevallen merkt u niets van het feit dat uw stabyhoun lijder is.